

全国气象

未来一周,西南地区东部和南部、江汉、黄淮南部、江淮、江南、华南西北部和东部等地累计降雨量有50毫米~150毫米,其中汉水下游、江淮、江南西部和北部及广西北部等地部分地区有180毫米~250毫米,局地可超过500毫米;上述大部地区累计雨量较常年同期偏多5成~7成,部分地区偏多2倍以上;西北地区东部、黄淮北部、华北北部、东北地区中北部等地累计雨量有10毫米~20毫米,局地30毫米~60毫米。 信息来源: 中国天气网

上周概况:4日~10日:平均气温26.8,较常年同期偏高2.9℃,最高气温38.5℃,最低气温18.7℃,降水量12.7毫米,较常年同期偏多1.9毫米;日照时数71.2小时,较常年同期偏多12.6小时。
下周预报:预计12日~17日有一次降水天气过程,出现在12日-13日,有小雨。最高气温37℃左右,出现在15日。
信息来源:寿光市气象局

寿光气象



麦收前后 守好棚门将害虫拒门外

芒种之后,北方地区小麦进入集中收割期。在棚室蔬菜产区,小麦收割后,外界害虫失去了主要栖息地,它们为了生存,就会寻找新的栖息地。而当前,气温高,无降雨天气时,棚室通风力度大,大棚顶部风口及前脸处,拱棚顶风及两侧风口均处于敞开状态,如不加有效阻碍,就会成为害虫迁徙进棚的通道。害虫进棚后,繁殖迅速,为害大。因此,麦收前后,菜农应加强棚室防虫工作,杜绝害虫迁徙进棚。

大棚通风口、门口处加设防虫网

对于大棚来说,重点是在大棚风口和前脸处设置防虫网。也有经验菜农将防虫网换成遮阳网的,既能利用黑色趋避害虫,又能降低棚温而不影响通风效果。同样道理,种植拱棚的菜农朋友,也应该在拱棚两侧和顶部

安装防虫网。还需注意的是,菜农还可以在大棚前脸和拱棚两侧的中下部加设一层薄膜,起到防虫又防雨的作用。另外,细心的菜农还在棚室入口处,或者棚边小屋门口处,加设一层防虫网,确保棚室入口万无一失。

清除棚室周边杂草

记者在棚区采访时发现,很多大棚附近种植有面积不等的小麦。气温高,害虫喜欢栖息在阴凉处,麦收后,棚室周边的杂草无疑是不错的选择,然后再进一步进入棚室中,为害蔬菜。所以,要及时清除棚室周边杂草,在保证安全的情况下,可以选择使用除草剂,之后,可以补喷一下杀虫剂,进一步减少虫源。喷施除草剂时,菜农应选择无风天气,并提醒周边棚室关闭风口,然后喷药时,在喷头上加防护罩等措施,可有效避免除



大棚前脸杂草丛生

草剂飘移进棚产生蔬菜药害。部分棚室前脸内侧也是杂草丛生,或者是菜农种植的多种蔬菜,同样也是害虫的栖息地,因此,建议菜农一并拔出,并喷施杀虫剂,减少虫源。

棚内悬挂粘虫板

建议菜农在棚内悬挂黄蓝粘虫板,麦收前后,要首先观察前脸处和

风口处的粘虫板上害虫数量及种类的变化,便于及时掌控棚内害虫发生情况,及时用药,降低损失。

合理用药预防

若棚内发生虫害后,先要认清害虫种类,然后再选择合适的药剂进行防治。防治时,还要结合害虫的生活习性和杀虫剂特点,灵活加入助剂,起到增效的作用。另外,建议不同的杀虫剂交替使用,避免产生抗性。当棚室内有棉铃虫等危害时,可以撒施毒饵、毒土,亩用4.5公斤左右的炒香麦麸或粉碎后的炒香棉籽饼,与15%毒死蜱颗粒剂1000克拌成毒饵;而对于粉虱、蓟马、蚜虫等应注意虫卵兼杀,粉虱可用噻虫嗪+烯啶虫胺;蓟马可用乙基多杀霉素+虫螨腈;蚜虫可用螺虫乙酯+吡蚜酮。

本报记者 刘志梅

高温强光 蔬菜用药细思量

高温强光环境,对蔬菜来说是一种逆境。无论从环境,还是从蔬菜自身长势来说,都容易产生药害。因此,菜农朋友在用药时,一定要充分考虑用药方式和时机。

气温高、地温高,植株地下、地上长势不佳,整体抗性差,同时,白天气温高,棚体储热多,夜间棚内温度高,植株易徒长。综合来看,植株长势偏弱,对外界刺激的耐受力降低,因此,菜农用药时,应严格按照农药使用说明或者指导用量进行配比,不可轻易增加农药使用浓度。同时,高温强光环境下喷药,蔬菜容易产生药害。如很多药剂中的成分受温度影响很大,尤其是杀虫剂中很多未知助剂,高温时很容易造成叶片损伤。所以,夏季喷药,要合理农药使用浓度及用药时间。记者建议,夏季喷药一定要选在10时以前和15时以后的时间段里。药剂喷洒完毕后,要保证足够的通风时间,使药液既浸润叶片,又使水分蒸发的时间不过长或过短,才能达到最佳的防治效果。同时注意,蔬菜花期对农药较敏感,高温下很容易发生药害,因此应尽量避免在花期喷药。植株顶部的幼嫩组织耐药性较差,不要重复喷药。

降低点花药浓度,减少激素中毒。点花是通过使用植物生长调节剂打破蔬菜体内原有的激素水平,

并形成新的平衡以利于营养向花部运送。正常情况下,蔬菜点花一般在早晨见光后1-3小时进行,温度达到20℃以上时,是最佳的点花时间。以番茄为例,菜农在点花时,用毛笔或海绵等蘸取药水涂抹在花柄的关节或关节近花段处,能起到很好的促进果实发育的作用。蔬菜点花是蔬菜管理中十分关键的农事操作,不仅要注意点花的时间和方式,还要及时根据季节的变化,灵活调整点花药的成分及浓度。

那么,高温季节为什么要适当降低点花药浓度呢?温度高,水分蒸发快,点花药使用后,水分减少会导致浓度增加;再者蔬菜新陈代谢快,意味着对点花药的吸收能力强,植株体内点花药量增加。从这两方面来讲,当前的环境及植株条件,容易造成点花药浓度的增加。而点花浓度过高,会造成果实畸形,或者是随着温度升高,植株生长加快,这类物质就会被运输到生长点部位,造成蔬菜新叶皱缩,不舒展,严重时呈鸡爪状,呈现出激素中毒的症状。

此外,和点花药一样道理,蔬菜徒长后,选择化学药剂控旺时,应注意把握用量,确保不过量、不重复喷施,以减少激素中毒的情况发生。

本报记者 刘志梅

育苗喝上“奶粉级”肥 安全又高效



瑞莱美瑞宝为育苗专用肥,采用食品级肥料,定位精准,使用安全、高效,称之为“种苗的奶粉”。为适应市场需求,结合季节、品种、区域、水质等的不同,育苗专用肥共推出5款。育苗使用时,工厂可结合各自情况,选择适宜的类型。同时,使用瑞莱美瑞宝后,不必再用清水冲洗叶片,照样安全。

实践证明,使用瑞莱美瑞宝育出的种苗,根系发达,紧裹基质,占满整个穴盘,颜色白嫩;茎秆粗壮,韧性好,不易折断,定植后茎秆病害明显减少,尤其是茎基腐病发生率大幅降低;植株整体长势健壮,叶片完整,颜色深绿、厚实,节间距离适宜。

本报记者 刘志梅

勒芬®



包装规格:
20克、100克、200克、
500克、1000克、
5000克

主要防治蚜虫、蓟马、白粉虱、斑潜蝇等各类虫害。

银穗®



虫螨腈 30%
包装规格: 100g

具有胃毒及触杀作用
可防治小菜蛾、菜青虫、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、斑潜蝇、蓟马等多种蔬菜害虫。



山东办事处:寿光瑞佰达农资有限公司
技术服务电话:13780889668 客服电话:13165261568

