换膜后

管理不变通 小心蔬菜遭大殃

当前，又到了大棚换膜的时候了，每年换膜后，总有些棚室中的蔬菜出现这样或那样的问题。更换新棚膜后，新膜透光率都在90%以上，棚内温度至少比换膜前提高3℃-5℃。棚室环境改变后，菜农若不及时调整管理措施，蔬菜就会表现生长异常。

换膜后避免蔬菜徒长

换膜后大棚里光照明显增强，同样的通风条件下，现在中午棚内的温度都在35℃左右，换膜后的一段时间容易导致昼夜温差过小。这么高的温度，再加上底肥充足，蔬菜前期生长旺盛，若棚内通风降温不力，蔬菜极易出现徒长的迹象，最终导致坐果率降低。因此，对于当前蔬菜来说，首先要考虑温度的调节，一般白天应将温度控制在30℃，夜间应控制在15℃，温差控制在10℃左右，避免温度过高、温差过小。同时，应适度控水控肥，并结合植物生长调节剂，防止植株徒长。另外，换膜后植株长势加快，菜农应及早整枝吊蔓，避免田间郁闭。

换膜后早防病虫害

环境条件的变化，必然导致病虫害发生也会有很大变化，菜农应注意加强管理，减少问题出现几率。

换膜后易高发的病虫害

防病毒病

棚膜更换后，棚内温度升高，光照变强，湿度变小，正是适合病毒病发生的条件。而随着外界温度的变化，玉米等作物收获，棚外的蚜虫、粉虱等害虫也开始大量向棚内迁飞，导致病毒病传播进入最后一个高峰期。因此，换膜后，一定要加强病毒病的预防。

防卷叶、裂果等生理性病害

随着光照变强，温度升高，叶片的蒸腾作用必然迅速增加，这就需要根系提供更多的水分供应。一旦土壤盐渍化、板结等影响，根系功能不够强大，叶片等就容易出现缺水问题，从而加重卷叶问题。更换棚膜后，棚内温度变化更快，温差更大，也更易加重裂果等生理性问题。

防虫害

棚膜更换一般选择晴朗天气，此时外界害虫多处于活跃期，尤其是很多蝶蛾类害虫，常常趁更换棚膜时进入棚内。很多棚室周围种植着韭菜、丝瓜、白菜、玉米等作物，常常诱集大量的害虫，会加重害虫的传入情况。

预防措施

不管是病毒病还是卷叶、裂果等生理性病害，其发生大都是由于环境条件剧烈变化引起的，想要减轻其为害，首要的措施就是减轻环境变化的程度，换膜前要注意提前浇水，确保棚内湿度，并随水冲施生物菌肥、甲壳素等，促进根系再生，提高根系抗性，确保植株养分充足，抗性更强。换膜后，还要注意提早通风，光照过强时适当遮荫降温，避免环境条件剧烈变化。

其次要注意喷药预防。可以选择悬浮钙1500倍、海藻酸750倍、苦参碱1000倍、嘧肽霉素750倍等喷雾。钙肥、海藻酸等可以快速补充叶片营养，提高细胞活性，增强抗逆性，减少病毒病、卷叶等问题发生。苦参碱既可以杀虫，又可以减少病毒病发生。嘧肽霉素主要预防病毒病。

本报记者 吴荣美

万兴塑业 产品过硬 服务至上

寿光市万兴塑业有限公司主要经营高端优质农膜，多年来销售的农膜产品一直质量稳定，售后服务有保障，深得用户青睐。

ネオコート
NEO COAT 尼奥科特
超级PO膜



日本原装进口
山东省总代理

住化积水—来自日本 采用PO膜最新配方及涂层工艺技术

- 消雾抗流滴效果长期、稳定、持续，与膜体同寿命，使用3年-5年；
- 透明度优异，透光率高，纳米自洁，无灰尘吸附；
- 柔软且抗拉伸抗撕裂强度高，超长的使用寿命；
- 保温性能优越，升温迅速有效防冻害。

扫码看视频

シエノソ 化崎5+1EVA PO膜
- 超强的流滴性
- 卓越的透明性
- 强度提高
- 防雾性提高
- 耐候性提高
- 保温性更好

万兴 5+1PO膜
- 高透光
- 高强度、耐老化
- 高保温性
- 高抗静电防尘
- 持续消雾、流滴能力更强

万利EVA棚膜
- 使用进口高端原料，采用德国五层共挤技术
- 优异的消雾流滴功能
- 升温快，保温效果好，高透光性

寿光市万兴塑业有限公司 联系电话:13583655632 18263623538

广告