



“码”上学农技 种植更轻松

新媒体传播速度快,短视频可视化强,“视频在线”栏目以短视频的形式讲解蔬菜生产中的难点、重点和痛点,将现场画面和语言讲解合二为一,让广大菜农更直观地了解蔬菜种植技术。记者制作的短视频会在抖音或快手等新媒体平台发布,大家只需拿出手机,打开抖音扫一扫,即可观看小视频。如果菜农在蔬菜生产中遇到种植难题或发现热点技术,也可与本栏目记者联系。赶紧“扫一扫”,在线学农技吧!



小小土疙瘩 弯椒巧变直

尖椒生长过程中,如果开花结果期温度过高、留椒位置低、水肥供应不足或枝杈阻挡等因素都会导致弯椒的出现,这样的果卖不上高价。

预防尖椒弯果,菜农可将棚内的白天温度控制在25℃-30℃,夜间15℃-17℃;追肥时大量元素与功能型肥料配合使用;调控植株长势,避免徒长;发现果实被叶片及枝条阻挡时,及时将果实移开。除了采取上述措施,有些菜农采取了一个土办法,即在发现果实变弯后,及时在果尖部涂抹上土疙瘩,靠重力的作用,使弯椒变直。



黄瓜返棵后 留瓜莫着急

黄瓜拉瓜多,负担重,不少植株出现了瓜打顶现象,表现为植株生长停滞,生长点紧聚不舒展,生长点附近的节间变短。瓜打顶是一种生理性病害,可见于不同生长阶段的黄瓜。当植株长势弱、气温较低时,更容易发生。如果不及时采取措施进行缓解,黄瓜的结瓜能力会减弱,甚至会出现长时间的歇茬现象。

已经出现瓜打顶的植株,建议菜农及时将生长点附近的幼瓜摘除,促进植株的营养生长。返棵后,留瓜时间不要太早,如果留瓜较早,植株长势尚未恢复,留下的瓜容易出现刺瘤下移、瓜把长的情况,品质并不高。建议菜农,等黄瓜再生出5片以上的新叶时再继续留瓜。



尖椒“吃饱喝足”才能多结果

红尖椒优质高产,膨果期的管理很关键。与留绿果相比,留取红果的尖椒生长期更长,消耗的养分更多,必须要有健壮的植株做支撑,避免出现坠住棵子、生长停滞的情况。留取红椒后,植株经常出现黄头增多的情况,主要原因就是坐果较多,植株负担过重,根系吸收的养分供应不上,从而出现黄头问题,进一步影响果实的转色速度和色泽。

提醒菜农,浇水冲肥时,切忌只使用高钾型水溶肥,建议使用高氮高钾水溶肥与高磷型水溶肥复配冲施,同时配合冲施甲壳素、生物菌肥等功能型肥料,一方面促进下部果实的快速成熟;另一方面养护根系,促进植株上部的花芽分化和坐果。



扫码看视频

**寿光市新世纪种苗有限公司**

世纪威力 708

长势强健
抗病高产

紫萼长茄进入“世纪威力708”时代

卖相好不污皮 耐寒性好

- 适当稀植、控棵
- 果长28-38cm,果径5cm左右
- 不污皮,果型顺直,无阴阳面
- 中后期产量优势明显
- 适宜秋冬温室及早春保护地种植

丹尼尔 103

耐低温弱光 瓜条匀称

- 抗病抗逆性强
- 连续坐瓜能力强
- 瓜码密,瓜条深绿色
- 果长16-20厘米,光泽度好
- 耐低温弱光,产量高
- 适宜保护地早春、秋延迟和越冬栽培

电话: 15706305015