



码上看报



码上订报



“码”上学农技 种植更轻松

新媒体传播速度快,短视频可视化强,“视频在线”栏目以短视频的形式讲解蔬菜生产中的难点、重点和痛点,将现场画面和语言讲解合二为一,让广大菜农更直观地了解蔬菜种植技术。记者制作的短视频会在抖音或快手等新媒体平台发布,大家只需拿出手机,打开抖音扫一扫,即可观看小视频。如果菜农在蔬菜生产中遇到种植难题或发现热点技术,也可与本栏目记者联系。赶紧“扫一扫”,在线学农技吧!



辣椒萎蔫死棵 问题不在根

提起蔬菜死棵,菜农首先想到的往往是根系出了问题,其实,茎秆染病同样会造成蔬菜萎蔫死棵。近段时间,辣椒茎秆上灰霉病的发生依然较为严重,茎秆初生水渍状不规则病斑,病部产生灰白色霉状物,病斑向下蔓延至分杈处,导致辣椒萎蔫。


针对灰霉病导致的烂秆,菜农可以选择菌核净、异菌脲、啉菌恶唑等药剂,喷雾与涂抹结合进行。同时,在保证棚温的基础上,尽可能通风降湿。摘叶摘果时,尽量将叶柄和果柄留得长一些,可留2厘米-3厘米,给病菌侵染茎秆留出时间,便于及时治疗。



给点儿甜头 蓟马好上钩

蓟马虽小,危害却不小,一旦棚内形成了足够的虫口基数,大大增加药剂防治的难度,而且容易反复发生。蓟马喜欢温暖、干旱的天气,春季的棚室环境非常利于蓟马的繁殖。

蓟马多为害花蕾、嫩叶、嫩梢等,且具有较强的昼伏夜出的习性,建议菜农在喷药防治蓟马时,一定要掌握技巧,别盲目用药。根据蓟马喜欢甜的特点,菜农在喷药时,可在每桶水内加入150克-200克白糖,不但可以提高药剂的黏着性,还能起到诱导的作用。喷药时间最好选在早晨或傍晚,此时光照不强,蓟马开始出来在作物表面活动,药液容易喷到。



单靠喷药防霜霉 效果差一点儿

霜霉病发生严重的棚室普遍存在植株根系弱、叶片生长不良和留瓜过多等现象。染病叶片多为功能性叶片,导致有效光合面积减少,对植株的整体影响较大。

防治霜霉病,在合理用药的同时,还要注意养护叶片,提高叶片的抗病性。菜农可在喷洒药剂时,每桶水加50克的白糖或葡萄糖,调节叶片碳氮比,提高药物的防效。近几天阴雨天较多,棚内湿度增大,为霜霉病的发生创造了有利条件。建议菜农及时通风排湿,能有效延缓霜霉病的发病速度。



防治叶霉病 不能只喷药

叶霉病主要危害叶片,植株中间部位的叶片往往先发病,逐渐向上扩展至幼嫩叶片。发病初期,叶片正面可见黄褐色近圆形或不规则形的病斑,叶片背面着生灰褐色或黑褐色的霉层,霉层的颜色随着病情的扩展逐渐加深。叶霉病的发生,除了与棚室环境有关外,叶片发育不良,抗病力弱也是重要的影响因素。

防治叶霉病,菜农可以喷洒唑醚·氟酰胺、肟菌·戊唑醇、苯醚甲环唑等药剂。同时要注意养护叶片,喷施氨基酸类、甲壳素类叶面肥,每7天-10天喷一次,缓解叶片黄化,提高叶片的抵抗力。

