



“码”上学农技 种植更轻松

新媒体传播速度快,短视频可视化强,“视频在线”栏目以短视频的形式讲解蔬菜生产中的难点、重点和痛点,将现场画面和语言讲解合二为一,让广大菜农更直观地了解蔬菜种植技术。记者制作的短视频会在抖音或快手等新媒体平台发布,大家只需拿出手机,打开抖音扫一扫,即可观看小视频。如果菜农在蔬菜生产中遇到种植难题或发现热点技术,也可与本栏目记者联系。赶紧“扫一扫”,在线学农技吧!



叶片被“抹黑” 防病又防虫

蔬菜生长过程中,经常出现叶片表面附着黑色霉层的情况,有时候果实上也会出现霉点。与灰霉病、叶霉病等病害的霉层不同,叶片或果实表面附着的这些霉层用手可以抹掉,实际上,这是煤污病。


煤污病主要是由于白粉虱、蚜虫等害虫分泌的蜜露黏着在叶片或者果实上,被真菌侵染后引起的。叶片发病,严重影响叶片的光合作用,导致叶片早衰脱落,同时还能增加其它病害的侵染几率;果实发病,影响果实的正常转色,降低果实的商品性。防治煤污病,菜农可以喷洒多菌灵、甲基托布津、啞菌酯等药剂,连喷2次-3次,以防感染其他病害。在喷药防病的同时,还要做好害虫的防治工作。



黄瓜生长后期 管理咋调整?

当前,春茬和一大茬黄瓜已经进入生长后期,植株长势衰弱、叶片老化严重,畸形瓜增多,建议菜农不要再一味延续结瓜盛期的管理办法,适当调整一下管理措施,促使黄瓜多结两支瓜。

黄瓜生长后期的施肥,应以提高植株长势和促进肥料的快速吸收为目的,适当增加氮肥的用量,增强植株的长势。黄瓜到了生长后期,根系的活性变差,吸收水肥的能力降低,再加上蔓子很长,水肥的转运速度变慢,此时应以叶面追肥为主,通过勤喷施营养型叶面肥代替部分根部追肥,使植株快速获得营养。



阴晴不定 茄子叶部病害高发

随着一大茬长茄进入生长后期,叶片开始老化,抗逆性降低,叶部病害高发。当前发生较多的主要是叶霉病和褐色圆星病。叶霉病危害时,叶片正面出现大小不等的黄斑,叶片背面病斑处着生灰褐色或黑褐色的霉层。褐色圆星病多从叶缘开始侵入,病斑较小,呈红褐色或黑褐色圆点,后期病斑连接成片,叶片易破碎,严重时导致落叶。

防治叶霉病,菜农可以喷洒唑醚·氟酰胺、肟菌·戊唑醇、苯醚甲环唑等药剂。防治褐色圆星病,菜农可以喷洒异菌脲+中生菌素或肟菌·戊唑醇+啞菌铜等药剂。除了合理用药,菜农应加强叶片的养护,喷施氨基酸类、甲壳素类叶面肥,避免叶片黄化,提高叶片抵抗力。



紫茄变红茄 问题出在哪?

色泽是影响茄子品质的重要因素。果皮光滑、紫黑油亮有光泽的茄子,收购商加价也要抢着收。然而,随着光照增强,茄子很容易“变脸”,既由原来的果实紫黑油亮变成颜色发红、失去光泽,有的茄子出现紫萼转绿色的情况,颜值大跌,卖不上高价。

茄子果皮变红属于生理性问题,品种抗逆性差、棚内温度过高、光照不足或肥水不良等因素都能导致该问题的出现。当前,光照逐渐增强,如果摘叶过度,使茄子果实暴露在强光高温条件下,就会导致茄子转红。另外,菜农过多冲施含氮量高的肥料,也会影响果实的转色与膨大。

