



码上看报



码上订报

预计未来一周，西藏南部、云南及华南西部多降雨，华北、东北多阵雨或雷阵雨天气，强降水中心较分散。

5日-7日，华南西部和南部以及西藏南部等地有中到大雨，局地暴雨或大暴雨，并伴有局地短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

7日-8日华北南部、黄淮等地有中到大雨，局地暴雨。

4日-9日，华北南部、黄淮西部、江汉、江南西部等地先后有3天-5天日最高气温35℃-38℃的高温天气。

信息来源：中国天气网

预计未来一周，阴雨天气较多，5日-6日预报有小雨，白天最高气温36℃。

信息来源：山东省寿光市气象局



雨水进棚危害大 灵活应对减损失

近几日，受台风“杜苏芮”的影响，我国很多地区出现强降雨过程，无论给棚室蔬菜还是露天蔬菜的生产都造成了严重的影响，不少棚室发生雨水倒灌，导致作物遭受涝害，进而引发死棵。提醒菜农，抢排田间积水后，根据蔬菜受害情况，灵活调整管理措施，力争将损失降到最低。

1 深翻或划锄 提高土壤的透气性

棚室一旦进水，会导致土壤板结，含氧量低、透气性差，蔬菜定植后缓苗慢，不利于根系生长，因此，菜农应做好土壤的处理。

当前，正是秋茬蔬菜定植的时候，有的棚室已经定植，有的棚室还未定植。对于还未定植且进水严重的棚室或雨后拔苗需要重新定植的棚室，菜农应进行全棚深翻，可结合施底肥进行。土壤深翻，不但能提高土壤的通透性，还有利于将雨后带来的杂菌及有害物质翻入土壤深层，减少日后烂根死棵问题的出现。

对于已经定植且进水不严重的棚室，菜农应勤划锄。当棚内土壤见干见湿时，即可划锄。划锄的深度应视蔬菜根系生长情况而定。处于旺盛生长期的蔬菜或拱棚蔬菜，因根系已经扩展下扎，可适当深划锄，一般控制在4厘米-5厘米左右，2天-3天后再划锄一遍，可降低土壤含水量，促进根系迅速恢复。刚定植不久的小苗，由于根系浅、弱，划锄时不要靠植株太近，防止将根系划断，影响苗子的正常生长。以后，也要适当增加划锄的次数，打破土壤板结，提高土壤的透气性。

已经覆盖地膜的棚室，最好将地膜揭开，晾晒土壤，并进行划锄，以加快土壤水分的散失，防止沤根。未覆盖地膜的棚室，菜农不要着急覆盖地膜，最好天气转凉或植株恢复正常生长后再进行地膜的覆盖。覆盖地膜时不要紧贴茎基部，如果紧贴茎基部，土壤中的水分蒸发后在地膜口上凝成水滴，然后顺茎基部流淌，很容易引发根部及茎基部病害的发生。



雨水进棚致沤根



雨水进棚苗子被冲倒

3 养护根茎叶 促进植株复壮

棚室一旦进水，轻者影响根系生长，严重的造成死苗死棵。菜农要及时将歪倒的植株扶正，冲洗叶面污泥，促使其尽快恢复生长；及时整枝疏果，去掉无效空枝、烂果、病叶等，带离棚室，防止滋生病害；及时扒开蔬菜茎基部周围的土壤，加快水分蒸发，让部分根系接触空气，2天-3天后再重新覆土，待土壤见干见湿时，及时划锄。雨水进棚后，蔬菜伤口多，抗性差，田间湿度大，易感染细菌性软腐病、猝倒病、疫病等多种病害，表现为水烂头、水烂叶、水烂秆等，菜农可以用金雷、烯酰吗啉等药剂配合噻唑锌、春雷霉素等药剂一起喷施，防止病害发生。

棚室进水会造成土壤养分流失，天晴后，菜农要抓紧补施氮磷钾肥和有机肥，以恢复地力。叶菜类蔬菜以氮肥为主，少施勤施，瓜类、茄果类蔬菜应该氮磷钾肥配合施用。浇水时，注意生根产品的使用，促进根系快速生长。棚室进水后，根系或多或少受到影响，吸水吸肥能力减弱。在根系生长不良的情况下，菜农应注重根外追肥，快速补充营养。菜农可叶面喷施全营养叶面肥或甲壳素、海藻酸等功能型叶面肥，增强植株的抗逆性。受害后的苗子，根系吸水能力减弱，晴好天气时容易出现萎蔫现象，菜农要及时通风降温，避免棚内温度过高，并适当遮阳。

本报记者 吴荣美