

专 家 热 线		
蔬菜		
姓名	电话	擅长领域
朱振华	0536-5223025	病虫害防治
王中春	0536-5226646	病虫害防治
文延年	13806362558	病虫害防治
刘春香	13356722088	病虫害防治
邵树策	13583682866	病虫害防治
刘立功	13355361106	无公害栽培
	QQ: 2265626898	
刘天英	15306363606	病虫害防治
尹克忠	15054487898	病虫害防治
韩俊	13864661952	栽培管理
	QQ: 1798721872	
冀春光	18053676567	栽培管理
贾令鹏	13336368122	病虫害防治
王成增	国家进	栽培管理
王宽	15624216000	病虫害防治
姜文丽	18866707190	病虫害防治
马云星	18866707120	病虫害防治
吴荣美	15653691383	栽培管理
果志华	13869672375	栽培管理
刘志梅	18763650086	栽培管理
果品		
姓名	电话	擅长领域
刘世杰	13853695983	果树病虫害防治
	QQ: 1747521752	
刘冠义	13606364558	果树栽培管理
秦海岩	13953211287	果实栽培管理
土壤肥料		
姓名	电话	擅长领域
丁光国	13963670856	土壤改良及肥料检测
陈永智	胡永军	土壤改良
食用菌		
姓名	电话	擅长领域
孙庆温	13853622920	食用菌栽培管理
曹德宾	13589002882	食用菌栽培管理



西红柿中下部叶片发黄

山东省东营市一菜农电话咨询:我棚内的西红柿中下部叶片发黄,发生面积还不少。请问这是根系不好,还是上了什么病?应该怎么防治?

刘天英答:经与菜农朋友交流得知,他棚内这种情况不是突然发生的,而是慢慢发展起来的,且叶片变黄是整个叶片变薄变黄。出现这种现象,首先要考虑根系不好,七月份定植的西红柿,在高温强光条件下,光合作用就会受到抑制,且为了降低温度和减少病毒病的发生,菜农往往会浇水较多,这种管理方式下,根系会生长不良,因此,当植株坐果后,在果实膨大过程中,果实需要更多的营养,从而导致根系营养不良而造成根系早衰。建议管理过程中一定要加强根系养护和营养供应,可以使用鱼蛋白有机水溶肥料和海藻酸有机水溶肥料,起到生根养根和膨大果实的作用,同时也要注意钙、镁、硼等中微量元素的补充,避免缺素症发生。

泡椒脐腐病



山东省青岛市莱西市一菜农朋友微信咨询:我的泡椒近期果实脐腐病出现比较多,如何缓解?

贾令鹏答:脐腐病主要是果实缺钙引起的,生产中植株缺钙、温湿度变化剧烈都能引起。缓解建议:1、平衡土壤湿度;2、及时补钙,可以冲施、叶喷相结合;3、注意培养健壮植株,生产中脐腐病一般和日灼病混发,可以喷施氨基酸等叶面肥培养健壮植株。

西红柿心叶发黄

山东省青州市何官镇一菜农电话咨询:我种植的西红柿最近出现心叶发黄的症状,但叶片不皱缩,请问这是不是病毒病?如何防治?

冀春光答:根据症状描述,这应该不是病毒病,而是生理性问题导致心叶变黄,如天气、肥料、浇水等因素造成植株根系受伤,对微量元素吸收不足而出现黄叶。建议菜农及时采取以下措施加以缓解,首先,

调控棚室环境,及时通风降湿,并拉大昼夜温差,防止徒长;其次,合理浇水,避免大水伤根,尽量不要在阴天浇水,小水勤浇配合中耕划锄;最后,叶面追肥,可用氨基酸、甲壳素及微量元素叶面肥喷施,提高叶片对不良环境的抵抗力,促进植株健壮生长。

茄子“断头”

山东省寿光市纪台镇一菜农电话咨询:我的茄子近期出现顶部生长点“断头”的情况,如何缓解?

贾令鹏答:这是生理性问题。当植株茎秆嫩、脆,生长不协调时容易出现,生产中引起茄子“断头”主要是温湿度变化剧烈引起的。缓解建议:1.平衡棚内温湿度,控水不要过度,创造适宜植株生长的环境条件。2.叶面喷施磷酸二氢钾、海藻酸等叶面肥,提高叶片光合作用,培育健壮植株。



甜瓜茎秆水烂

山东省寿光市田马一菜农电话咨询:甜瓜结瓜部位的下面茎秆上出现水烂,腐烂部位无菌丝,也无流胶,请问这是什么病害?应该怎样防治?

邵树策答:根据症状描述分析,这应属于细菌性腐烂病。当果实较大时,若茎秆部位长期处于湿度较大的环境中,或者棚内有滴水状态时,很容易使茎秆部位感染细菌,从而导致腐烂。建议全棚喷施一次杀菌剂,可以喷施春雷·王铜,每桶水25毫升或铜高尚50毫升,混加甲霜灵40克,最好同时用上述药剂兑成糊状,对重点病株发病部位进行涂抹,提高用药效果。

黄瓜角斑病



河北省廊坊市一菜农电话咨询:我棚内的黄瓜细菌性角斑病很严重,虽然喷了药可是效果不好,请问应该怎么办?

尹克忠答:与菜农交流后得知,他的棚室风口设置不妥当,导致棚内通风不良,湿度很大造成了细菌性角斑病的严重发生,虽然及时用药,但有适宜的环境条件,病害仍然难以控制。建议菜农改为微喷或滴灌系统,通过减少浇水量来降低棚内的湿度,同时适当少留瓜,增施叶面肥,药剂防治可选用50%氯溴异氰尿酸+33.5%啞啉铜;或30%啞菌酯·苯醚甲环唑+75%百菌清+30%

琥胶肥酸铜,5-7天一次,连续使用2-3次。



pH9以上的鲜鸡粪是否可用



山东省聊城市东昌府一菜农电话咨询:最近想购买鲜鸡粪,用pH试纸检测鸡粪的pH9以上,请问该鸡粪是否可以施用?

丁光国答:鸡粪的pH9以上碱性较强,不要购买为宜。若还未交款购进,建议不要采购。若已经付款购进来了,未经再堆腐不宜施用。发酵腐熟方法,应保持水分含量60-70%,进行覆膜堆沤腐熟,必要时添加有机物料腐熟剂、调酸剂加快发酵腐熟。采购鸡粪、有机肥、水溶肥料等肥料时,pH试纸法测定酸碱度比较粗放,误差较大,且试纸易失效、易污染,结果可靠性较低。



黏菌的传播

山西省晋城市一菇农电话咨询:请问菇棚感染的黏菌是如何进行传播的?

孙庆温答:黏菌可以通过空气传播孢子到我们食用菌的培养料上,繁殖出成团的营养体后,再通过自身的运动及害虫和喷水等继续传播;如果菇棚内的湿度和培养料的湿度都很大,发菌和出菇环境的温度很高,通风又很不好,那么在这样的条件下,黏菌就很容易生长,所以,在生产中,防止黏菌侵染,就要避免以上的几个不利因素。

黏菌的防治

山西省晋城市一菇农电话咨询:请问菇棚发现黏菌后,应该如何防治?

孙庆温答:根据查阅有关材料,可以用药剂防治。防治方法是笔者查阅资料而来,笔者也没有亲自治疗过黏菌,所以菇农们一定要先做小面积试验,然后才可以大面积使用。可以选用啞菌灵(又名涕必灵、特可多)500-1000倍溶液喷洒,对木霉、曲霉和黏菌的杀死作用明显;还可以用0.1%浓度的高锰酸钾溶液或0.1%浓度的硫酸铜溶液杀灭。

促根壮苗 保花保果 防冻解害 控旺防徒长 抗逆增产又增收

还是爱多收[®]好

技术咨询电话/微信:13606950729(洪)