



码上看报



码上订报

24小时服务热线：0536-5253221
2023年12月8日 星期五 责编/吴荣美 美编/籍红

天气与棚事 | 11

全国气象

预计未来一周,较强冷空气将影响北方地区,中东部地区将有较大范围雨雪天气。
8日-9日,受较强冷空气影响,华北、黄淮、东北地区气温将下降4℃-8℃,内蒙古东部、东北地区中南部降温幅度可达10℃以上;新疆北疆、内蒙古东北部、东北地区北部有小到中雪或雨夹雪,局地大到暴雪。
10日-11日,华北、东北地区中南部有小到中雪、局地大雪,黄淮北部、陕西北部有雨转雨夹雪或雪。
13日-15日,西北地区东部、华北、黄淮、江淮、江汉及江南北部等地将再度出现雨雪天气。

信息来源:中国天气网

预计未来一周,雨雪天气较多,10日、11日、13日和14日预报有雨夹雪。

信息来源:山东省寿光市气象局

寿光气象

留取红椒待高价 莫让价高无好果



近几年,山东省青州市、寿光市等地种植红尖椒的很多,很多菜农选择卖完一茬绿椒后再留取红椒。然而,记者在山东省寿光市古城街道戴家村采访时了解到,近段时间绿尖椒的行情一直不好,而红尖椒的价格却很不错,因此有些菜农决定年前不再卖一茬绿椒,而是直接留取红椒。从第一批尖椒果实长够个到转红上市,往往需要40多天的时间,在这段时间内,植株上挂着很多已经长够个的果实,而且上部的花果在不断发育,植株对营养的需求大大增加,一旦管理跟不上,不但影响植株的长势,而且影响果实的品质,即使留取红椒也不一定能卖上高价。

持续养根 植株不黄头

冬季尖椒黄头的情况非常普遍,尤其是植株挂果时间长时更容易发生黄头。导致尖椒黄头的原因较多:一是根系生长不良,受当前低温、阴雨等不良天气的影响,加之地温低,容易造成尖椒根系生长发育不良;二是留果多且长时间不采摘,导致植株养分不足;三是浇水不当沤根或炸根;四是根部病害或根结线虫为害。在根系吸收和生长都不良的情况下,植株的生长点就会表现出元素缺乏的症状,进一步影响尖椒的转色速度和色泽。

现阶段,植株上挂着很多果实,果实膨大期所需要的营养在逐渐加大,建议菜农养护好根系,协同好地上部与地下部的关系,减少黄头的发生。养根见效最快的办法是合理使用生根产品。像氨基酸、海藻酸、甲壳素等成分的功能型产品,兼具改良土壤、促生新根、养根等多重功能。甲壳素类产品还可以促进有益菌的增殖,抑制有害菌生长,为根系生长营造安全的土壤环境。含生物菌的产品施用到土壤中后,不仅具有解磷解钾的作用,其代谢产物还能刺激根系生长,当根系受伤后有益菌群还可抑制有害菌的侵染。养根的同时,菜农还可喷施氨基酸类叶面肥,可快速改善黄头现象。

若出现了沤根或炸根,建议浇水时小水勤浇,并做好根部病害的预防,防止病菌趁机从伤口处侵染危害。低温季节浇水,要选择在天晴好天气的上午进行,此时地温与水温相近,不会造成炸根现象。若上了根部病害或根结线虫,菜农还应及时使用相应药剂灌根。



挂果多管理要跟上

合理用肥 膨果又壮棵

要想提高尖椒的产量,膨果期的管理很关键。留取红果的尖椒生长期更长,消耗的养分更多,必须要有健壮的植株做支撑,避免出现坠住棵子、生长停滞的情况。膨果期浇水冲肥时,切忌只使用高钾型水溶肥,建议使用高氮高钾水溶肥与高磷型水溶肥复配冲施,同时用量要合理,一方面促进下部果实的快速成熟;另一方面健壮植株,促进植株上部的花芽分化和坐果。

加快转色 提高卖相

当前红尖椒的价格不错,菜农应想方设法加快尖椒的转色,以赶上好行市。尖椒转色的快慢与品种关系很大,菜农在选择品种时应该选择早熟性好、转色快、成熟后亮度高、色泽鲜红、辣度适中的品种。当前,菜农可通过调控棚温、增加光照的措施加快尖椒转色。施肥时,菜农应重视补充钙肥,可叶面喷施也可冲施,既能改善果实的色泽,还可增加果实的重量,提高产量。

另外,菜农要及时整枝打杈。进入结果盛期后,枝叶繁茂,菜农应及时去除内膛枝及结果主枝下部不结果的侧枝,提高枝叶间的通透性,让果实接受更多的阳光,加快转色。

减少畸形果 提高精品率

冬季低温季节,尖椒上的畸形果比较多,比较突出的是果实变弯、短小,严重影响商品性。硼肥缺乏、开花坐果时温度没有控制好、植株长势没有调控好等因素会导致果实变短;而果实受外力阻挡、开花结果期温度不适宜、营养不足等因素会导致果实变弯。

要想提高精品果率,菜农一定要调控好开花结果期的温度。夜间温度控制在15℃左右,白天温度控制在28℃-30℃,根据自己的棚室情况合理通风。辣椒很容易徒长,菜农可通过合理喷雾控棵药剂进行控长,控棵药剂要使用安全系数高的,切忌控棵过重,以免对花和果实产生不良的影响。尽量不要采取过度控水的措施来抑制植株徒长,花期缺水极易引起畸形果、弯果的产生。开花结果期,菜农要及时补充中微量元素,提高花芽分化的质量。一般来说,钙、镁、硼、铁、锌等对花芽分化有很大影响,菜农可及时喷洒硫酸锌、磷酸二氢钾、硼钙肥或复合中微量元素促花肥,减少畸形花、花小、花少等问题。若遇连阴雨天气,菜农可提前冲施单硅酸,促进花芽分化,改善坐果情况。如果枝杈阻挡了果实的生长,菜农还应及时将果实移开,让其垂直生长,避免果实变弯。

本报记者 吴荣美