



# “码”上学农技 种植更轻松

新媒体传播速度快,短视频可视化强,“视频在线”栏目以短视频的形式讲解蔬菜生产中的难点、重点和痛点,将现场画面和语言讲解合二为一,让广大菜农更直观地了解蔬菜种植技术。记者制作的短视频会在抖音或快手等新媒体平台发布,大家只需拿出手机,打开抖音扫一扫,即可观看小视频。如果菜农在蔬菜生产中遇到种植难题或发现热点技术,也可与本栏目记者联系。赶紧“扫一扫”,在线学农技吧!



## 整枝打杈 拿捏好时间

整枝打杈过程中会给植株造成伤口,一旦遇到高湿环境,伤口愈合慢,病原菌会趁机从伤口侵入,导致番茄烂秆死棵。提醒菜农,避免阴天整枝打杈,应选择晴天的上午进行,有利于伤口愈合。

浇水后1天-2天内不要整枝打杈,因为浇水后,植株含水量较高,整枝打杈产生的伤口较大,不易愈合。打杈后及时喷洒一遍百菌清、甲基托布津等保护性药剂,避免病菌尤其是细菌性病害的发生。摘叶摘果时,尽量将叶柄和果柄留得长一些,可留2厘米-3厘米,给病菌侵染茎秆留出时间,便于及时治疗。



## 番茄初果期 管理有侧重

番茄初果期是营养生长和生殖生长齐头并进的关键时期。此期,菜农既要把握好地上部与地下部的平衡,又要把握好营养生长与生殖生长的平衡,为番茄的优质高产打好基础。

番茄进入初果期后,根系的生长速度较苗期放缓,菜农要促生更多的毛细根,提高根系对水肥的吸收利用率。摘叶不宜过狠,只摘老叶、黄叶、病虫叶即可,并不定期喷施氨基酸、海藻酸或甲壳素等类型的功能型叶面肥,养护叶片。对于徒长的植株,菜农可通过喷施控旺药剂、整枝打杈等操作控制植株徒长。初果期留果不宜过多,第一穗留三个果即可,从第二穗往上到第五穗可各留四个果。



## 喷药不当 番茄干叶边

番茄叶片干枯、花穗脱落、萼片干尖,几乎全棚植株都出现相似的症状,这是喷药不当导致的药害。处于初果期的番茄,地上部生长较快,各器官和组织相对幼嫩,耐药能力差,喷药时,如果菜农混用药剂的种类过多或浓度过大,容易导致药害的出现。

对于受害的植株,菜农可以叶面喷洒氨基酸、甲壳素或海藻酸类的叶面肥,缓解叶片的受害症状。在防病治虫时,菜农应严格控制药剂的种类及用量,喷药宜选择在晴天进行。药剂喷洒完毕后,要保证足够的通风时间,使药液既浸润叶片,又使水分蒸发的时间不过长和过短,才能达到最佳的防治效果。



扫码看视频



## 欢迎订阅 2024年度《北方蔬菜报》

全年订阅价格60元/份

外地读者可通过线上中国邮政微商城或者到线下全国各邮政网点订阅  
国内邮发代号 23-319



码上订报

《北方蔬菜报》是全国蔬菜专业技术性主流媒体。自创办以来,坚持“以菜为媒、传技赋能,根植菜乡,服务全国”的理念,始终用最贴近、最实用、最前沿的技术服务全国菜农。致力于传播蔬菜大棚种植技术,解答菜农生产中遇到的疑难病害,帮助菜农增产增收,现已发展成为全国蔬菜技术传播平台、全国蔬菜质量标准中心推广应用平台。《农民日报》刊文“《北方蔬菜报》因实用性受菜农青睐”;《中华新闻报》以“不会说话的蔬菜技术员”为题对办报工作予以肯定。

咨询热线: 18866707299