



《北方蔬菜报》“有声有色”栏目推出以来，粉丝量不断攀升。本栏目以视频形式讲解蔬菜生产要点、三农故事、致富经等，将现场画面和讲解合二为一，让广大读者更直观地了解、学习。《北方蔬菜报》制作的精彩视频发布在“北方蔬菜报抖音号”“北方蔬菜报视频号”等新媒体平台上，只需用手机抖音扫一扫，即可观看，既便捷又实用。
赶紧抖音扫一扫，在线学起来吧！

“码”上学艺 种植更轻松

□记者刘志梅报道



幼苗服用片剂 番茄花美果好

近日，记者目睹了张师傅为番茄幼苗“服用”片剂，他先在幼苗中间刨坑，放入5个片剂后覆土。尽管番茄苗长势健壮，这些片剂作用仍引人好奇。

据了解，这些片剂成分是糖化硼，其作用是为番茄补充硼肥，为后续花芽分化奠定良好营养基础。正常情况下，该片剂应在番茄定植前使用，一棵一片，将片剂放置在定植穴底部稍深位置，距幼苗根系两三厘米，如此可避免影响根系正常生长。


而此次张师傅因幼苗较大，不仅加大了用量，还改变了使用方法。这种片剂的合理使用，为番茄生长提供关键营养，助力番茄实现花美果好。



蔬菜生长黄金期 合理补钙正当时

春天，蔬菜生长迅速，是提升产量的黄金时期，而充足且均衡的营养供给，尤其是中微量元素的补充至关重要。补钙选对产品还要注重补充方法，采用灌根与叶面喷施相结合的方式，补钙效果更佳，还可与全元素营养混合使用。


叶面喷施具有速效性，能在短时间内为蔬菜补充所需营养，快速改善缺钙症状。而灌根则是将营养注入土壤，蔬菜根系依据自身需求吸收，不仅能改善植株营养状况，剩余营养还会储存于土壤中，待植株需要时随时吸收，发挥长效作用。这种“速效+长效”的补钙模式，能全方位满足蔬菜快速生长需求，助力蔬菜健康生长。



春季小黄瓜易皱皮 防范管理用好三招

春季，大棚内外温差大，管理稍有不慎，小黄瓜易出现皱皮问题，严重影响其商品性。

避免小黄瓜皱皮可从几方面入手：一是合理放风。春季风大且温度多变，放风需循序渐进，切不可一次性放风过大。可在风口下设置挡风膜，缓冲冷风，防止小黄瓜因温度骤变而皱皮。二是及时补充中微量元素。通过及时喷施或冲施硼、钙等中微量元素肥，有助于增强小黄瓜的抗逆性，减少皱皮现象。三是加强肥水管理。维持棚内土壤见干见湿的状态，浇水不宜过量，避免瓜条因突然大量吸水而快速膨大，进而出现皱裂。另外，选择抗皱皮的小黄瓜品种也是至关重要的。



果穗折断损失大 吊穗操作要正确

近日，记者在山东省潍坊市一处番茄种植区采访时发现，部分大棚内出现了不少果穗折断的情况，棚主损失较大。据介绍，果穗折断情况的发生，是由于涂抹免吊穗时机不当造成的。

番茄在膨果中后期不采取辅助吊穗措施，果穗很容易被压折，导致果实无法顺利转色、成熟。一般来说，在番茄点花10天左右，当每穗的第二个果实长至“乒乓球”大小时，就应及时进行吊穗或者涂抹免吊穗操作。进行涂抹操作时需格外注意，一是涂抹时间要适宜，不能过晚；二是要注意涂抹位置，不可仅涂抹果穗或相连处的茎秆，应将两者及连接处均匀涂抹，这样才能达到更好效果。

